

可能引起光过敏的药物名单

本表列举的都是受紫外线照射易增加敏感的药物和化学品,即可引起光毒性反应和光变应性反应的药物。美国FDA要求卫生专业人员查阅本表、《医师书桌参考手册》(PDR)以及其他参考资料,以解决关于(a)使用发射紫外线灯和(b)暴露于阳光等情况的用药问题。

可能的光过敏药物举例

产品类别	一般名和化学名
痤疮治疗 抗菌剂	13-顺维甲酸、维甲酸、磺胺药(磺胺甲异恶唑、磺胺异恶唑、磺胺嘧啶)、萘啶酸、甲氧苄胺嘧啶+磺胺甲异恶唑、卤代水杨酸苯胺、卤代二苯脲、卤代酚(包括除臭皂的抗菌剂、防腐剂、化妆品)。
抗生素	四环素和四环素衍生物;金霉素、去甲基金霉素、强力霉素、甲烯土霉素、二甲胺四环素、土霉素。
抗惊厥药 抗忧郁症药	氨甲酰氨基草、三甲双酮、阿米替林、去甲丙咪嗪、多虑平、丙咪嗪、去甲替林、普罗替林。
抗糖尿病药 (降血糖药)	磺酰脲类(醋磺环己脲氯磺丙脲、甲磺氨基草脲、甲磺丁脲)。
抗组织胺药	苯海拉明、丙咪嗪、苯丙哌啶、扑尔敏。

抗微生物药/抗 感染药	灰黄霉素。 煤焦油和煤焦油衍生物、木焦油和石油产品。
治牛皮癣药 (化妆品也含有)	氯噻酮、速尿、噻嗪类及其复方。
利尿药 (和抗高血压药)	
染料	吡啶、葱、曙红(唇膏)、真曙红、氢化萤光素、甲紫、亚甲兰、橙红、甲苯胺兰、吡啶黄、锥虫兰、玫瑰红。
雌激素和孕酮	炔雌醇甲醚、异炔诺酮、己烯雌酚。
黑素生成剂 (化粧品含有)	呋喃并香豆素类(5-甲氧基补骨脂素、8-甲氧基补骨脂素、4-5-8三甲基补骨脂素)。
香水和化妆品 (化粧品中精油)	含香精油、佛手油、雪松油、枸橼油、薰衣草油、梨莓油、迷迭香油、檀香油、柠檬油。
安定药	泰尔登、多虑平、氟哌啶醇、克塞平、氮砷噻吨、吩噻嗪类;乙酰奋乃静、氯丙嗪、氟奋乃静、奋乃静、甲哌氯丙嗪、硫醚嗪、三氟奋乃静、三氟丙嗪。

[Pharmacy Times 《药学时代》, 48(10):32, 1982(英文)]

张钧译 张紫洞校

· 药物相互作用文摘和评论 ·

五、霉可乃除与华法令

作者报道2例应用华法令病情稳定的病人,后服用霉可乃除(Miconazole)却使华法令抗凝血效应显著增强。

第一例是55岁的妇女,已经服用双氢氯噻嗪(100mg/日)、氨氯吡咪(Amiloride)(10mg/日)、地高辛(0.25mg/日)和华法令(4mg/日、5mg/日交替)。应用一段时间后,凝血酶原时间比率维持在正常治疗范围之内(2.0到3.0)。然后她服用霉可乃除(250mg/每日4次)共2周,12天后报告说有血泡,易发生皮下出血。凝血酶原时间比率为16.0。停用霉可乃除和华法令、后来又单用华法令,病情稳定。

第2例的情况也相似,在开始使用霉可乃除250mg、每日4次)后11天,凝血酶原时间比率上升至23.4,这时华法令的剂量是6mg/日、7mg/日,隔日应用。单用此剂量的华法令加上其它药物,曾在一段时间获得了满意疗效。停用霉可乃除后,每天应用6mg华法令,又重新恢复到正常情况。

这种相互作用的机理不明,作者认为可能是华法令的血浆蛋白结合被置换的结果。虽然有关这种相互作用从前曾有报道,但知道的人不多。作者建议:“使用华法令的病人需加用霉可乃除,应密切监测凝血酶原时间比率”。

[AJP《澳大利亚药理学杂志》, 64(757):267, 1983(英文)]

戴诗文译 张紫洞校