

发热儿童的降温.....	曾慎健译	2	79
抗忧郁药、抗精神病和抗躁狂			
药的动力学参数.....	朱亚峰译	2	封三
左旋多巴与食物.....	康鲁平译	3	20
Aztreonam与氯林可霉素磷			
酸酯配伍的稳定性.....	顾振平译	3	27
苯二氮革类的药物动力学及临			
床效应.....	藏志和译	3	28
肌注氟哌啶醇治疗顽性呃逆.....	邹本泽译	3	37
色氨酸作为催眠剂.....	韩保民译	3	37
丙咪嗪与硝酸甘油.....	魏文树译	3	48
氟哌啶醇与消炎痛.....	孙 涛译	3	48
甲氟咪呱与普鲁卡因酰胺.....	郑芝屏译	3	48
食物与氧异安定.....	张振家译	3	52
美国医院药师协会州分会薪金			
调查报告(1984年).....	景凡伟译	3	58
新型液体药物缓释剂型设计.....	贾丹兵译	3	58
异搏定在人乳中的浓度.....	韩保民译	3	66
苯妥因与茶碱的相互作用.....	吕光明译	3	77
消炎痛与氨基吡唑和双氢克尿			
塞.....	魏文树译	3	77
利多卡因的副作用.....	施建飞译	3	80
专家们建议停用防疫药复方息			
症定.....	管延臣等译	3	80
硫氮革酮与地高辛的相互作用.....	申庆亮译	4	25
山楂治疗闭经有良效.....	王宝奎	4	32
阿司匹林在固体混合物中的稳			
定性.....	王 敏译	4	32
红霉素引起卡马西平中毒1例.....	邹本泽译	4	40
阿司匹林与潘生丁的药动学相			
互作用.....	李扬岩译	4	63
麻醉性镇痛药和布洛芬并用对			
癌症患者的效果.....	刘海友译	4	64

地高辛—乙胺碘呋酮—甲状腺			
机能减退的相互作用.....	费逸明译	4	75
吸烟可降低西咪替丁的疗效.....	刘海友译	4	80

其 他

药学英语阅读资料译注出版.....	1	2
药物样品测试服务.....	1	2
代办药学习题集邮购.....	1	5
阿司匹林临床新用出版.....	1	10
牛磺酸.....	2	41
美国药典21版溶出试验与异物		
检查规定出版.....	2	56
不要重“牙膏”轻治疗.....	2	65
吸烟确实有害.....	2	65
图书邮购改址启事.....	2	78
中国药学年鉴编委会第6次会		
议在南京召开.....	2	80
全国化学分析及分离方法学术		
讨论会在沪召开.....	2	80
沈阳军区卫生部举办第一届药		
政管理学习班.....	2	80
补购本刊读者注意.....	3	7
代办文献复印服务工作.....	3	51
外国正在研究中药美容.....	3	61
中草药化妆品.....	3	61
1987年本刊开始征订.....	3	79
新药与临床分册征订启事.....	3	79
欢迎订购中国药学年鉴.....	3	80
告作者·译者·读者.....	4	22
制剂学(理论与应用)出版.....	4	47
《新药介绍》第IV—V辑出版.....	4	71
数学药理与临床讲习班在榕举办.....	4	71
1986年总目录.....	4	77

· 文摘 ·

吸烟可降低西咪替丁的疗效

十二指肠溃疡是一种治疗后容易复发的疾病。短期服用西咪替丁、甲硝咪呱等抑酸剂类抗溃疡药，虽有一定效果，但一般认为这种效果并不持久，一旦停药后，有90%以上的患者在6个月以内溃疡复发。

最近Sephon Sontag等报道，将服用西咪替丁的病人分为200mg，1天2次；300mg，1天2次及睡前400mg等3组，连续服药一年，溃疡的复发率明显减少。这3组不同给药法的复发率几乎无明显差异，分别为19%、15%、13%。但是这3组与安慰剂组比较有显著差异，后者为34.7%。此

外，还发现复发率与吸烟有一定关系。安慰剂组中吸烟者的复发率为72%，非吸烟者仅21%，两者有显著差异。同时应用西咪替丁组中吸烟者的复发率为34%，与安慰剂组的非吸烟者比较，大致相同。因此认为吸烟是诱发十二指肠溃疡复发的重要因素。所以戒烟比应用西咪替丁更为重要。其原因是基础及高峰时的胃酸分泌量，吸烟者往往比非吸烟者增加。作者提示，本研究3组长期给药而复发率低的主要原因之一，就是强调增加夜间给药。

[《药局》，36(6)：131，1985(日文)]

刘海友译 郭步英校