

回顾两年来贯彻执行《药品管理法》所走过的历程,有成功的经验也有值得吸取的教训,但是领导重视、各方支持、广大医药工作者共同努力是取得成绩的保证。应当看到我们所取得的成绩还仅仅是药政工作法制化的一个良好开端,加强法制教育是一个长期任务。晋江假药案时隔半年多,军队又有人贩卖假药,说明药品监督管理工作只能加强,不能放松。

我们还应当看到,目前我军的药政药检

机构和队伍建设与执行《药品管理法》的需求还存在某些不相适应的地方,这需要我们长时期进行努力才能根本改善。

军队药品监督管理工作已经从单纯的经验管理、行政干预开始逐步向着依靠科学管理和依法办事的方向转变。我们应当有决心、有信心完成党和人民交给的重大使命。为提高药品质量、保证用药安全有效、不断开创药政管理工作新局面而努力。

※ ※ ※ ※ ※

## · 文摘 ·

### 高血压控制:减轻体重与美多心安比较

有关超体重与高血压之间的关系已有许多报道。减轻高血压患者的体重对其血压的影响也作了多次的研究。通常认为减轻肥胖型高血压患者的体重与其血压降低密切相关。体重减轻与应用一线抗高血压药物美多心安对血压的影响已在一组年轻超体重的轻度高血压受试者中进行对照研究。

减轻体重与应用美多心安(200mg/天)是在随机用安慰剂对照的56名超体重、年龄在55岁以下的高血压患者中进行比较试验。试验开始21周后减轻体重组病人的体重平均下降7.4kg。收缩压和舒张压也分别下降13mmHg,和10mmHg)。其收缩压下降比安慰剂组明显得多,但与美多心安组无差异性。舒张压的降低均比美多心安组和安慰剂组明显。试验至21周末时体重减轻组中一半受试者的舒张压降至90mmHg以下。试验前的舒张压均在90~100mmHg。

体重减轻组的总胆固醇和总胆固醇与高密度脂蛋白一胆固醇的比率均降低,而美多心安组高密度

脂蛋白一胆固醇也降低,但总胆固醇与高密度脂蛋白一胆固醇的比率却增加。

作者认为:“据试验表明,在治疗年青超体重高血压患者时,减轻体重21周以上对降压具有重要的临床意义,尤其对血脂和脂蛋白不会出现现象通常使用一线抗高血压药物如美多心安可能产生的副作用。”然而作者却提示,采取减轻体重方法降压的远程效果尚需进一步研究。作者还指出,通过限制饮食来减轻体重,并且使其体重长期维持下降是有一定困难的。

考虑到上述因素后作者的结论是:“据试验表明,尽管还存在有争议和难以坚持的问题,但轻度高血压患者通过减轻体重来降低血压确是一种可行的方法。然而这种常规疗法可限制在全体人口中60~70%的适应症患者中应用”。

[AJP《澳大利亚药学杂志》,66(788):854,1985(英文)]

吴建忠译 苏开仲校

### 丁香油 毒性

丁香油是一种治疗牙痛的传统药,但曾报道有一病例表明它可能比通常所了解的更危险些。

一名24岁的妇女试着倒了一些丁香油在容器里直接用于右上第二颗前磨牙的颈部。起初有一些刺痛和附近有些轻度发炎,炎症在几小时内即消失。接着在她右眼下部及上唇稍上的受影响面部出现知觉减退,汗液不足。

约在一年后的体格检查表明,受影响部位知觉明显减退并发生无汗症,同时在她起初试图治疗的

牙齿上方龈部的知觉也减退。

作者总结该病例指出:上述病人因洒漏丁香油可引起轻微的、短暂的刺激,接着出现持久性局部麻醉和无汗症,这大概是由于一种直接神经毒性的作用。

[AJP《澳大利亚药学杂志》,66(3):184,1985(英文)]

谭真译 何芬芬校