

## 过量“双宝素”引起躁狂症一例报告

陆军杭州疗养院 徐樟永

叶××、男性、39岁、浙江籍，××县环保装备厂厂长。因工作紧张，过度劳累，在三天时间内服用双宝素400ml（杭州中药二厂产品，筒装100ml一瓶）每天无规定次数，每次无定量，任意饮服。服用后通宵不寐，精神兴奋，第三天出现情绪激动，言语改变，发号施令，稍遇不称心之事便发怒，乃至想动手打人。无幻想、无幻听幻视，思维联贯，时间、空间等定向能力正常。有自知能力，但不能自我控制，家族中无精神病史。出现上述症状一周后送北京安定医院就诊，诊为“燥狂症”。给予碳酸锂0.25g，一天三次口服治疗，三天后症状消失，精神恢复常态，住院半个月出院。出院后继续服用碳酸锂0.25g，一日一次维持量。连续服一个月，症状未复发。

### 讨 论

随着社会主义生产的发展，人民生活水平不断提高，过去温饱型生活需求观念发生了根本的改变。滋补强壮剂的需求量迅速增加。目前市场上滋补强壮品种繁多，在此提醒人们注意几点：

1. 保持正常的生活规律，注意劳逸适

度。一些年青力壮的同志乃至中学生，因为工作或学习紧张，想借补药来消除工作或学习的疲劳，收效甚微，其结果往往适得其反。

2. 服用滋补强壮剂要适量，切勿过量。认为补药多吃无害的想法是一种误解，据报道，人在内服3%人参酞200ml可出现中毒现象，全身玫瑰疹、瘙痒、眩晕、头痛、体温升高及出血。曾有一例一次内服人参酞500ml而导致死亡的报道。

3. 选用滋补强壮剂应根据其特性和个人的适应症，切忌盲目选用。

“双宝素”为滋补强壮剂的一种，主要成分为人参和蜂乳。人参对中枢神经有兴奋作用，人参含量4%；蜂乳有增进食欲、促进新陈代谢等作用。体质虚弱、病后衰弱或老年体衰者，适量服用双宝素是有益的，能增强体质，促进病后康复；对老年人有增强抵抗力和延年益寿等作用。本例患者由于过度劳累，大量服用双宝素（一般常用量10ml，一天三次），使中枢神经过于极度兴奋状态，失去控制，以致出现躁狂状态。

## 口服卡马西平致大疱性表皮松解型药疹一例

南京军区总医院药品科 陆晓和

最近我院收治了一例因口服卡马西平所致重症药疹患者。现报告如下。

患者王××，女，17岁。病人自10岁患癫痫病起，长期服用大仑丁、抗癫灵、鲁米那等药。1987年1月起服用上述药物已不能控制癫痫大发作，故于1月19日停用上述药

物，采用口服卡马西平0.13/日，癫痫得到较好控制。2月2日，患者面颊部及眼睑皮肤出现红肿，有散在红色小丘疹，奇痒，但未介意。3日患者面、颈、胸部皮肤起红斑，部分红斑出现水疱，无发热，患者所属卫生所给予口服强的松10mg 2/日，这时