

## 中 医 药 简 讯

济南军区总医院 贡瑞生

△单用生大黄可排除结石 北京友谊医院内科根据生大黄有利胆、促进胆汁分泌,扩张括约肌的药理作用,单用生大黄治疗结石,能使胆内结石自然排除体外。通过对42例胆结石病人服用生大黄片的临床观察,各种类型结石的排石率达73.8%,排出的结石最大为 $1.1 \times 0.6 \times 0.5$ cm,服药后一般在一周时开始排石,无一例发生胆道梗阻和结石嵌顿现象。该项研究属国内首次获得成功。

△四川研究成功外用中药速效剂 一种由脂溶性、醇液性、水溶性成分组成的“外用中药速效剂”,在四川省开县中医院研制成功。现已用此剂制成多种治疗药物,其主要有“速痛宁膏”,经364例患者初步临床试用,有效率94.66%,见效速度18.4秒左右。主要用于软组织损伤、关节炎、神经痛等。以同样见效速度的“外用止痛药酒”可用于关节疼痛及软组织损伤等。“天应膏”对94例患者应用观察,92.8%的病人贴于穴位反应点及局部后,其见效速度能与针刺响应速度相同。“速效化痰平喘擦剂”涂擦于某些穴位,能在半分钟内产生平喘作用。

△猴头健胃灵已通过省级鉴定 猴头健胃灵是以“无刺猴头”子实体为主药,与多种中药精制加工制成。初步测定表明,“无刺猴头”子实体内含18种氨基酸,其中药用价值较大的胱氨酸、组氨酸、精氨酸的含量较多,同时还含有多种微量元素和一般猴头中没有的特殊有机酸。动物实验证实:这种药物对大白鼠胃粘膜炎症损伤具有保护和修复作用,可以促进溃疡愈合。病理活检发现,胃粘膜颈粘液细胞再生活跃,数量显著增多,具有明显的细胞保护作用。经16所医院临床验证718例病人,证明该药具有较好的制酸、收敛、消炎止痛、消除胀满和增强食欲效果,治疗慢性胃炎、萎缩性胃炎、胃及十二指肠溃疡和消化不良等症,总有效率达97.7%,不仅疗效优于猴菇菌片和一般中药,

而且见效快,疗程短,无任何副作用,服用方便。

△贝母合剂治疗前列腺肥大 解放军234医院用中药贝母合剂内服治疗35例老年性前列腺肥大,效果良好。本组50~70岁者29例,71~76岁者6例,症状为排尿困难、急性尿潴留、前列腺I度增大10例,II度增大15例,III度增大10例。治疗方法:贝母、苦参、党参各25克,水煎内服,每日1剂,分2次服,一般用4~10剂即可见效,前列腺逐渐缩小,排尿通畅,个别排尿困难者先导尿或膀胱穿刺排尿后,再口服贝母合剂。治疗结果有效27例,无效8例,27例随访结果仅有2例复发,余均良好。

△南瓜粉治疗糖尿病有显著效果 南瓜含有蛋白质、脂肪、葡萄糖,还有矿物质维生素等,营养十分丰富。南瓜粉除可制作食品,如南瓜蛋糕、南瓜冰淇淋、南瓜酱等,在日本还用于治疗糖尿病,疗效显著。对治疗肝炎、肝硬化,肾脏病也有效。国内南瓜粉经北京、上海等医院数百例临床试验结果,证明对糖尿病疗效确实。

△绞股兰研究方兴未艾 绞股兰又名七叶胆,为葫芦科植物,近年来在国际上尤其是医药界,对此植物的研究发生了浓厚的兴趣,国内的研究也正在发展。化学研究证明,绞股兰的总皂甙具有与人参皂甙相类似的化学组份和生理活性。药理研究发现该药具有许多奇特的作用:1.对脂质代谢的影响,有助降低过氧化脂质及护肝作用;2.对胃、十二指肠溃疡的治疗有显著效果;3.对肝癌、肺癌、子宫癌、黑色素肿瘤细胞的增殖有抑制作用,而对正常细胞无影响;4.防止糖皮质类固醇的副作用;5.有明显的抗疲劳作用;6.对老年性白发有恢复作用;7.对失眠、头痛、精神不安等神经官能症患者均有明显疗效;8.毒理试验表明,绞股兰不表现毒性。目前国内已开

发了绞股兰系列产品，如绞股兰精、绞股兰茶、绞股兰“古兰可乐”、绞股兰晶、绞股兰蜂王浆等产品。日本近来也推出了以绞股兰为主要原料的“长命酒”。

△中医药临床疗效已达新水平 从7月16日在上海开幕的我国首次举办的中医药国际学术会议获悉，我国中医药的临床疗效已达到一个新的水平。如应用“化痰通腑法”治疗急性缺血脑卒中，“益气活血合剂”为主治疗急性心肌梗塞，其疗效已达到国内外先进水平；用“化淤尿石汤”治疗肾、输尿管结石，用“温肾利尿法”治疗输尿管结石嵌顿性肾积水症；用“胃金丹”治疗慢性胃炎；用“大菟丝子饮”治疗再障等均达到良好的功效；用中医中药对肺癌、胃癌、肝癌和大肠癌的治疗，其疗效也优于单纯用西药的治疗。用“肝血宝”、“冬虫夏草胶囊”、“益气煎”等对肿瘤化疗病人白细胞减少、免疫功能衰退进行治疗显示良好的升提效应。

△生精散治疗男性不育 遵义市男性不育研究所医师晋超文以中草药制成“生精散”，疗效显著，治疗男性不育总有效率达96.4%，1000例男性患者中，经治愈后

有303例的妻子已怀孕，其中102人已生小孩。该研究已通过省级鉴定，据认为这项成果已达国内外先进水平。

△补气通腠饮加味治疗产后尿潴留 江苏省东台县人民医院、中医院用补气通腠饮治疗30例产后尿潴留，效果显著。治疗方法：均服补气通腠加味方（炙黄芪、党参、麦冬、车前子、冬葵子、茯苓、泽泻、王不留行、制升麻、炒枳壳、通草）。每日1剂，水煎服，早晚各服1次。兼湿热者加炒知柏各10克，上肉桂1~2克（后下），或加金银花15克；淤血阻滞胞宫者加琥珀粉3~5克（冲服）。

△雷公藤治疗播散性神经性皮炎 福建省皮肤病防治研究所应用雷公藤治疗播散性神经性皮炎37例，取得良好效果。治疗方法：采用建宁县产药用雷公藤，剂量为每日25克，一剂两煎，每煎半小时，分两次服。7天为一疗程。治疗期间不加外用及其他口服药。结果痊愈3例，显效23例，有效6例，无效5例。多数病人在服药后第三天，其皮肤瘙痒程度即明显减轻，皮疹脱屑变薄。服药期间很少发生副作用。

## 国内外药物简讯 (1987年3季度)

△美国纽约州立大学的化学教授埃·布洛克发现，大蒜含有一种有抗凝作用的化合物(Ajoene)、它对治疗心脏病、循环系统病、动脉硬化、中风以及血淤等都有不同程度的疗效。不过要把这种化合物提炼出来作为一种药物使用，尚需经过严格的检验。

(药信)

△酮康唑是一种抑制卵圆形马拉色氏菌生长繁殖的有效药物。曾有报道口服酮康唑治疗头部银屑病和脂溢性皮炎有效，但时而有不良反应发生。作者给37名脂溢性皮炎患者局部应用2%酮康唑乳剂和安慰剂乳剂进行双盲法试验研究，观察患者头皮鳞屑中卵圆形马拉色氏菌的数目、形态变化和临床效果。结果2%酮康唑乳剂使头部活菌数目明显减少，其临床效果优良，治愈率占95%；安慰剂乳剂仅使一例患者好转，其余使用者

均无效。(药信)

△美国几位学者报道，肾上腺素可降低血透析患者的血钾浓度。随后本文作者用此药治疗三例危重患者。一是严重烧伤(面积90%)心跳复苏者，静滴肾上腺素20微克/分，10分钟后血钾浓度(mEq/l,下同)从8.5降为6.7。另一位是冠状动脉手术患者，发生无尿而进行血透析。静滴肾上腺素2微克/分，5分钟后血钾由6.7降至4.9。其三是主动脉瓣置换术病人。静滴肾上腺素13微克/分，30分钟后血钾自7.0降到6.4。

(药信)

△众所周知，扑热息痛是一种较为安全的常用解热镇痛药，但长期大剂量服用也产生肝积蓄中毒。对于患有慢性肝炎或其他肝功能不全的人来说使用扑热息痛往往会加重病情。去年美国斯特灵——温特洛普制药公