

继之喉部发痒、胸闷及气喘。查体：神清，BP12/8kPa，HR120次/min，律齐，双肺满布哮鸣音，胸透排除气胸。30min后突然呼吸骤停，10min后ECC上QRS波消失，心跳停止。日后尸解：支气管，气管内粘膜高度充血、水肿、有分泌物潴留，喉头水肿，符合过敏反应。曹静康等认为康宁克通A是一种激素类药物，病人有数次应用此药史，近阶段正连续口服激素，故可排除之。板蓝根内含的靛苷水解生成吲哚和葡萄糖，吲哚在空气中容易氧化缩合形成靛兰，此物可以致敏。

吴杰<sup>[8]</sup>报道柴胡、板蓝根注射液混合肌注引起过敏性休克1例。

板蓝根制剂不良反应虽属少见，但后果却不容忽视，因此临床应用时应询问病人用药史，对高敏体质的病人，应慎用；中西药针剂不宜混合使用。且应用时要注意观察用药后反应，以

便及时发现及时处理，避免出现严重后果。

### 参考文献

- 1 张英从. 口服板蓝根干糖浆致溶血反应1例. 陕西中医, 1997, 18(11): 522
- 2 于晓东, 程丽珍. 肌注板蓝根注射液所致肾损害1例报告. 实用儿科杂志, 1989, 4(2): 109
- 3 李景华, 谭升顺. 板蓝根注射液引起多发性肉芽肿1例报告. 临床皮肤科杂志, 1984, 2(1): 38
- 4 司凤仙. 板蓝根注射液致寻麻疹型药疹1例. 中国皮肤病学杂志, 1994, 8(4): 264
- 5 曾庆兰. 外用板蓝根注射液致接触性皮炎1例. 临床皮肤科杂志, 1992, 10(7): 232
- 6 柳栋平. 肌注板蓝根致过敏性休克1例. 四川医药, 1990, 11(2): 126
- 7 曹静康, 黄纯. 板蓝根过敏致呼吸心跳骤停1例报告. 江苏医药, 1997, 23(4): 229
- 8 吴杰. 柴胡、板蓝根注射液混合肌注引起过敏性休克1例. 广西中西医结合, 1993, 16(5): 28

(收稿: 1999-05-04)

## 口服阿司咪唑致严重不良反应1例

徐春慧 张淑萍(北戴河空军疗养院 北戴河 066100)

阿司咪唑(息斯敏)临床常用于各种过敏反应性疾病的治疗,未见引起皮肤严重瘙痒的报告文献。现将所见1例因口服阿司咪唑至皮肤严重瘙痒反应,报告如下:

### 1 临床资料

患者,女,16a,本院干部子女。因口唇红肿、热痛、干裂等,涂香油,口服布洛芬后,未见痊愈,反复发作有1a,故考虑为过敏所致。于1996年9月10日po阿司咪唑(西安杨森制药厂,批号:930508)10mg, qd,连服10d,症状明显好转痊愈。停药后3d,洗浴时,出现全身皮肤发红、伴瘙痒,继之瘙痒剧烈,其程度难以忍

受,无法继续洗澡,穿上衣服,未做任何处置,约30min后症状消失。再次洗浴时仍出现上述症状,已有2a。

### 2 讨论

2.1 该患者口服阿司咪唑前有服药史,但停药数日后无任何不良反应。

2.2 既往无任何过敏史。

2.3 该不良反应出现在服用阿司咪唑停药后3d,故考虑为口服阿司咪唑所致洗浴时皮肤严重瘙痒反应,但作用机制尚待进一步观察。

(收稿: 1999-04-02)