

静滴清开灵引起高热寒颤 3 例

贾义星, 赵喜荣(解放军第 264 医院, 太原 030001)

关键词: 清开灵; 不良反应

中图分类号: R286

文献标识码: D

文章编号: 1006- 0111(2000)02- 0100- 01

清开灵是一种纯中药复方制剂, 主要成分为牛黄、水牛角、珍珠母、黄芩、栀子、金银花、板蓝根等中药, 具有清热解毒、凉血消肿、祛风化湿、活血通络等功能。主要用于内科和儿科的多种热病和急性病等, 随着其临床的广泛应用, 其不良反应也见报道, 目前我院在应用清开灵过程中发现其致高热寒颤 3 例, 现报道如下:

例 1: 患者男, 53a, 因上呼吸道感染入院, 查体体温为 38.5 度, 实验室检查: WBC: $13.5 \times 10^9/L$, 其余检查正常。第一天给予青霉素 800 万 u iv gtt 治疗, 症状有所改善, d2 为巩固治疗, 在给予 800 万 u 青霉素后, 又将 30ml 清开灵(山西太行制药厂, 批号 981118) 加入到 250ml 生理盐水中 iv, 30min 后患者突然感到发冷、发热体温骤致 39.9℃, 立即给予地塞米松 5mg iv gtt, 10% 的葡萄糖酸钙 10ml iv gtt, 30min 后, 症状消失, d3 单独应用抗生素无此现象出现, 因此以上症状为 iv qtt 清开灵所致。

例 2: 患者男, 51a, 因急性上呼吸道感染入院, 查体体温为 37.7 度, 实验室检查除 WBC 稍高于正常值外, 其余均为正常。入院后治疗给予清开灵注射液(产地批号同上) 40ml 加入

10% 的葡萄糖注射 200ml 中 iv gtt, 当液体输至约 100ml 时, 患者出现不适感, 先是胸闷, 继之发冷, 发热, 体温升至 39.5℃, 考虑为清开灵所致不良反应, 立即停输液体, 密切观察病情变化, 30min 后, 病情缓解。

例 3: 患者男, 49a, 因间断性持续发热 37.6℃左右, 并伴口腔溃疡入院, 实验室检查 WBC $12.8 \times 10^9/L$, 给予清开灵注射液(产地批号同上) 30ml, 加入到 250ml 生理盐水中 iv gtt, 约 30min 后患者突然感到发冷、发热、寒颤, 继而颤抖不已, 体温达 39.4℃, 考虑刚刚输完清开灵, 可能是清开灵所致不良反应, 立即 im 异丙嗪注射液 25mg, 地塞米松 5mg 加入到 250ml 5% 葡萄糖注射液中 iv gtt, 吸氧等对症治疗, 20min 后患者停止颤抖, 1h 后症状缓解。

以上 3 例患者均无严重不良反应病史, 其不良反应均为应用清开灵后出现, 1 例是在应用清开灵过程中出现, 2 例是在应用清开灵完毕后 30min 后出现, 因此, 提示临床上在应用清开灵时, 应密切注意其不良反应的发生, 并延长观察时间。

收稿日期: 1999- 09- 01