

1 处方组成和制备

1.1 处方组成

本品每片含氢氧化铝 0.1g、血竭 0.1g、大黄 0.08g、延胡索 0.08g、海螵蛸 0.08g、薄荷油、淀粉各适量。

1.2 制备

将血竭、大黄、延胡索、海螵蛸用粉碎机碾成细粉,过 100 目筛与氢氧化铝混合均匀,用淀粉浆制粒,经干燥后,加入适量薄荷油,用 $\phi 12\text{mm}$ 平面冲模压片即得。

2 用途与用法

用于胃、十二指肠溃疡,胃酸过多,浅表性胃炎等。口服,每日 3 次,每次 2~3 片,饭前服用。

3 疗效观察

3.1 一般资料

我院收治的慢性胃、十二指肠溃疡患者共 114 例,诊断符合文献标准^[1],随机分为治疗组和对照组,治疗组 78 例中男 60 例,女 18 例,年龄 18~46 岁,平均 32 岁;对照组 36 例中男 20 例,女 16 例,年龄 20~40 岁,平均 30 岁,患者均在发病平均 2.5d 后就诊,经统计学处理,2 组病例无显著性差异($P > 0.05$),具有可比性。

3.2 疗效标准

治愈:临床症状消失,胃镜下观察粘膜恢复正常。显效:临床症状基本消失,胃镜下检查仅有轻度充血;有效:临床症状好转,胃镜下观察炎症减轻;无效:临床症状无变化,胃镜下检查溃疡无变化或加重者。

3.3 给药剂量和疗程

治疗组:胃溃平片 po,每次 3 片,tid,饭前服,15d 为 1 疗程,连服 2 个疗程。对照组;硫糖铝片

po,每次 1.0g,tid,盐酸雷尼替丁胶囊 po,每次 0.15g,bid,两药连服 30d。

4 治疗结果

治疗组和对照组经 30d 用药后临床疗效比较见表 1。

表 1 治疗组与对照组疗效比较

组别	例数	治愈 (%)	显效 (%)	有效 (%)	无效 (%)	总有效率 (%)
治疗组	78	5(6.4)	58(74.4)	13(16.7)	2(2.5)	97.5
对照组	36	0(0)	6(16.7)	25(69.4)	5(13.9)	86.1
合计	114	5(4.4)	64(56.1)	38(33.3)	7(6.2)	93.8

两组数据用 t 检验($P < 0.01$),表明治疗组疗效显著优于对照组。

5 讨论

胃溃平片为中西药结合的复方制剂,根据现代医学研究证实,氢氧化铝能在溃疡面形成一层保护膜,促进溃疡面的愈合^[2];血竭具有活血化瘀、止血凝血、消肿止痛、生肌敛疮等作用;延胡索有理气止痛、活血抗溃疡等功效;大黄具有破积、解毒、祛瘀、抗炎作用,海螵蛸有收敛、止血、制酸等作用;全方配伍具有科学合理性,药物可直接到达病灶处,促进组织再生及粘膜部分炎症的消除,达到病灶的修复,经临床 78 例患者使用,疗效显著,总有效率达 97.5%,且用药方便,无毒副作用,病人容易接受。

参考文献:

- [1] 陈灏珠主编. 内科学[M]. 第 3 版. 北京:人民卫生出版社, 1995:340.
 [2] 陈新谦,金有豫主编. 新编药理学[M]. 第 14 版. 北京:人民卫生出版社,1998. 326.

收稿日期:2002-06-03

头孢唑林钠致新生儿皮疹 1 例

边 旻, 徐春慧(空军北戴河疗养院 北戴河 066100)

中图分类号:R978.1⁺¹

文献标识码:D

文章编号:1006-0111(2002)06-0345-01

1 临床资料

患儿,男,26d,因肛门脓肿,于 2001 年 11 月 25 日收治入院,经局部处理后,给予头孢唑林钠(石家庄制药集团有限公司,批号:010137-2)0.5g,iv,qd。在第 3 天输液 20min 后发现患儿面部出现密集红色皮疹,高出皮肤表面,逐渐泛发致全身;患儿表现烦躁、啼哭、厌母乳,立即停药,即给予氯苯那敏 1mg,po,tid,未作其它处置。当天晚上,患儿皮疹颜

色由红转暗,第 2 天,患儿肢体红斑部分消失,颜面部皮疹消失最慢,服药 3d 后痊愈。

2 讨论

临床上使用头孢唑林钠致过敏反应已有报道,但该患儿仅为出生 26d,第 1 次用药即发生过敏反应,特此报告以引起重视,对皮试阴性的新生儿,决不能忽视,更应严密细心观察用药反应,以免延误抢救。

收稿日期:2002-06-17