

· 药物不良反应与相互作用 ·

罗通定致精神异常 1 例

刘安祥, 顾以华(中国人民解放军第 289 医院, 山西 侯马 043014)

中图分类号:R971 文献标识码:D 文章编号:1006-0111(2003)05-0312-01

患者,女,48岁。因患高血压每天坚持口服北京降压0号1片,2002年12月13日因痛经加服罗通定片(广西凌云制药厂,批号:20010817)60mg,用药1h后,突然出现精神异常,处于兴奋状态,坐立不安,烦躁多语,被害妄想,人物定向障碍及视物不清,出现逆行与顺行性遗忘。即嘱停服罗通定片。肌注安定10mg,约20min患者入睡,2h患者醒后,自觉一切正常。第二天常规口服北京降压0号片,未出现任何不适,故推断患者出现精神异常系罗通定所

致。

罗通定又名颅通定,左旋四氢帕马丁。是从中药防己科植物千金藤中提取的一种生物碱,具有较强的镇痛、镇静及催眠作用。临床常见不良反应可出现嗜睡、眩晕、乏力、恶心等。大剂量服用时对呼吸中枢有一定的抑制作用。有时可引起锥体外系不良反应。本患者常规用量服药,引起精神异常尚未见报道,其发病机理不明。提示临床应引起注意。

收稿日期:2003-03-03

乳糖酸红霉素注射液致过敏性休克 1 例

韩广轩, 李 杰(中国人民解放军第 534 医院, 河南 洛阳 471003)

中图分类号:R978.1+5 文献标识码:D 文章编号:1006-0111(2003)05-0312-01

1 临床资料

患者,男,26岁,无特殊病史。因上呼吸道感染伴鼻塞,流涕,咽部充血,双侧扁桃体 I°肿大入院。体检:体温 36.1 度,血压正常,给青霉素粉针剂 640 万 U 加入生理盐水 250mL,静滴,qd,5d 后症状未见好转。改用乳糖酸红霉素注射液 50 万 U(大连美罗大药厂,批号 20010303)加入 5% 葡萄糖注射液 500mL,bid,首次静滴乳糖酸红霉素注射液约 1min 时,患者突然出现颜面及口唇苍白,呼之不应,测血压为 0,诊断为过敏性休克。立即停用红霉素给予肾上腺素 1mg,im,静脉滴注地塞米松注射液 10mg,床边心电监护,吸氧,心率 48 次/min。4min 后测血压 160/100mmHg,患者烦躁不安,呼之能应,查双侧瞳孔等大等圆,直径约为 3mm,对光反应灵敏。2min 后测血压 155/100mmHg,自诉:腹胀,腹痛,再次予地塞米松 20mg,静注,50% 葡萄糖注射 10mL,

静推,心电监护仪示室早,而出现室性心动过速,立即叩击心前区,准备电复律时,心电监护示波转为窦性心律,心率 102 次/min,血压 100/80mmHg,5min 后患者颜面及口唇红润,心电图为正常,心率 68 次/min,血压 100/80mmHg,1h 后意识、情绪稳定,给予静滴利巴韦林注射液 600mg,清开灵注射液 20mL。qd,7d 后治愈出院。

2 讨论

乳糖酸红霉素透性低,不良反应较少,常见为胃肠道反应,表现为胃部不适、上腹痛、恶心、呕吐、腹泻等不同程度的直肠激惹症状。静滴浓度较高,速度较快及静注均可发生静脉疼痛,严重者可引起血栓性静脉炎,偶有皮疹、荨麻疹、红斑及大疱、血管神经性水肿等,但过敏性休克未见报道,其过激反应的机制未明,有待探讨。

收稿日期:2003-02-14