

• 短篇报道 •

疣可消擦剂的研制及应用

武传玺 傅东平 王海明 魏立明(解放军第 12 医院 新疆疏勒 844200)

关键词 疣可消; 扁平疣; 疗效观察

疣是由人类乳头瘤病毒(HPV)引起的良性表皮肿瘤,多见于儿童和青年。近年发现乳头瘤病毒感染后,少部分会导致皮肤癌、舌癌和宫颈癌等,因而日益引起人们的重视。本院经过多次临床试验,研制了疣可消中药制剂,临床应用效果良好,现报道如下。

1 处方及制备方法

1.1 处方 木贼,苦参,苍耳子,香附,蛇床子,白鲜皮,细辛,黄连,土贝母,氮酮,75%乙醇等。

1.2 制备 取上述中药炮制,切片,称量,用75%乙醇浸泡于密闭容器中 14d,提取过滤加氮酮至处方量,分装,50ml/瓶。

2 临床疗效观察

2.1 一般资料 本院病人及门诊病人 68 例,年龄 10~40a,以 12~28a 居多,病程 3mo~5a。疣多见于颜面,手背,前臂及胸颈等部位,以散在者为多,数目不等,大者如黄豆,小者如米粒。大部分使用过其它治疗方法,效果不佳,而采用此法治疗。

2.2 治疗方法 用疣可消液涂擦患处,qid,每次 2~3min。如有较大的母疣可用药棉浸药敷于疣上面保持 15~20min,效果更佳。1wk 后

复诊。

2.3 观察标准 痊愈:自觉症状消失,皮损消退,经 1~6mo 观察未见复发者。显效:自觉症状明显减轻,皮损消退 76%。无效:经用药治疗 1wk,自觉症状与皮损无明显改善。

2.4 治疗结果 临床观察 68 例,痊愈 42 例,显效 24 例,无效 2 例,总有效率为 97%。用药最短 6d,最长 12d,效果明显,无刺激,患者易接受。

3 讨论

扁平疣由 HPV 引起,人类是它的唯一宿主,宿主细胞是皮肤和粘膜上皮细胞,病毒存在于棘层细胞中,并可促使细胞增生,形成疣状损害。中医认为疣的病因机制为风邪伏于肌肤,风热血燥,肌肤失容。毛窍闭塞,温热蕴于肌肤,不得疏泄所致。疣可消由十几味中药配伍提取制成,具有活血化瘀,祛风祛湿,清热解毒,调整肌肤阴阳平衡,抗病毒作用,加入氮酮促进透皮吸收。上述组方合理,配制简便,经济实用,使用方便,疗程短,无刺激,效果佳,值得推广使用。

(收稿:1998-08-21)

紫外分光光度法测定炎痛喜康栓剂的含量

顾林祥 黄毅(上海第一妇婴保健院药剂科 上海 200040)

关键词 炎痛喜康; 栓剂; 紫外分光光度法; 含量测定

炎痛喜康是一种消炎镇痛药,难溶于水。口服剂型对胃肠道刺激性大,多数患者难以坚持服药,严重影响疗效。我院药剂科应临床医

生要求,研制炎痛喜康栓,临床用于原发性痛经,疗效迅速而显著。目前,国内尚无关于炎痛喜康栓的测定方法的报道。1995 年版药典收