

理^[10]。

神经系统反应。主要表现为颅内压增高, 精神症状, 可逆性脑病等, 停药后颅内压增高症状即自行缓解^[11], 改用其它药后症状消失^[12]。

消化系统反应。头孢唑林钠致消化道出血 1 例, 停药后对症治疗, 数日后恢复正常^[13]。

其它反应。“戒酒硫样”反应 1 例, 戒酒硫样反应是体内蓄积乙醛所致, 其作用机制是因为乙醇进入体内, 经肝乙醇脱氢酶的作用氧化为乙酰辅酶 A 进入三羧酸循环, 氧化为水和二氧化碳, 头孢菌素其母核 7-氨基头孢烷酸(7-ACA) 环的 3 位上有硫代甲基四唑取代基, 与辅酶 I 竞争乙醛脱氢酶的活性中心, 阻抑乙醛继续氧化而致蓄积产生戒酒硫样反应^[14]。应用头孢唑林钠的患者, 接触酒精时应引起注意。

参考文献:

[1] 黄全福, 陈佳辉. 头孢唑林钠过敏致死[J]. 药物不良反应杂志, 2002, 4(1): 25.
 [2] 谢 铂, 王视迁, 李文涛, 等. 头孢唑林钠引起尿潴留 3 例[J]. 中国医院药学杂志, 1998, 18(6): 250.

[3] 谢银莲, 吕干新. 静脉注射头孢唑林钠致心律失常 2 例[J]. 中华心血管病杂志, 2001, 29(11): 653.
 [4] 边 文, 徐春慧. 头孢唑林钠致新生儿皮疹 1 例[J]. 药学实践杂志, 2002, 20(6): 345.
 [5] 王 梅, 樊 娟. 头孢唑林致大疱性表皮松解萎缩型药疹一例[J]. 实用医技, 2001, 8(11~12): 865.
 [6] 陈树英. 药物致血尿 4 则[J]. 医药导报, 2001, 20(7): 457.
 [7] 郭建军, 杜志强, 刘民杰. 头孢唑林钠致肾功能不全患者癫痫发作[J]. 北京军区医药, 2001, 13(1): 41.
 [8] 吴世林. 头孢唑林引起心房颤动 1 例[J]. 新药与临床, 1993, 12(2): 117.
 [9] 盛红彬, 李安华. 头孢唑林钠致小儿严重血小板减少性紫癜[J]. 药物不良反应杂志, 2002, 4(6): 407.
 [10] 李瑞林, 张水林. 头孢唑林钠引起粒细胞减少 1 例[J]. 药学实践杂志, 1997, 15(1): 39.
 [11] 王 霞. 头孢唑林致颅内压升高一例[J]. 新药与临床, 1994, 13(2): 92.
 [12] 赵晓琴. 头孢唑林注射液致精神症状 1 例[J]. 中国医院药学杂志, 1997, 17(7): 329.
 [13] 沈鹃琴. 先锋霉素 V 注射液致消化道出血 1 例[J]. 现代应用药学, 1993, 10(4): 63.
 [14] 肖春华. 头孢唑林致“戒酒硫样”反应 1 例[J]. 药物流行病学杂志, 1996, 5(2): 120.

收稿日期: 2003- 06- 07

安痛定注射液致过敏性皮炎 2 例

周银芝¹, 刘晓华², 刘爱华¹(1. 中国人民解放军第 456 医院, 2. 山东省立医院, 山东 济南 250031)

中图分类号: R511. 6, R971⁺. 1 文献标识码: D

文章编号: 1006- 0111(2004)01- 0053- 01

1 临床资料

病例 1: 女, 45 岁。2003 年 1 月因感冒、头痛、发热 39℃, 来我院急诊科就诊。处方为: 口服抗感冒片(3 次/日, 2 片/次)和利菌沙片(3 次/日, 2 片/次), 并立即肌注安痛定注射液 2mL(山东益康药业有限公司)。5min 后, 四肢开始出现红疹并伴有小水泡, 立即停药, 几天后皮疹明显消退, 并开始结痂脱落。

病例 2: 男, 30 岁, 肝癌晚期。2002 年 8 月入院后, 因家境贫寒, 开始一直服用去痛片(3 次/日, 2 片/次), 止痛无效后改用安痛定注射液 2mL(山东益康药业有限公司), im。用药 15min 后, 病人开始咽

喉疼痛, 充血明显, 并伴有干咳, 四肢逐渐出现红疹、小水泡, 但病人停用此药数天后, 皮疹明显消退, 结痂脱落。

2 讨论

患者既往无药物过敏史, 经临床分析, 安痛定是一种复方制剂。其组分为: 每支 2mL 安瓿内含氨基比林 0. 1g、安替比林 0. 04g、巴比妥 0. 08g。此不良反应系由其组成成分中的某一种成分引起药物性皮炎。本文提醒广大医护工作者在应用该药品时, 应注意观察病人是否有过敏史, 密切观察, 确保临床药品使用的安全性。

收稿日期: 2003- 07- 14